



## BRONQUIECTASIAS: TRATAMIENTO DE LAS AGUDIZACIONES

PROA

Grupo de Infecciones Respiratorias

### I. CLÍNICA

- Astenia, fiebre, disnea, dolor pleurítico, hemoptisis
- Aumento del volumen y la purulencia del esputo.
- Cambio en la auscultación: sibilancias y aumento de crepitantes.

### II. DIAGNÓSTICO

- **Esputo** : Recoger muestra para Gram y cultivo antes de iniciar tratamiento antibiótico
- **Rx tórax**: excluir neumonía. Puede haber cambios con respecto a basal.
- **Hemocultivos**: si sepsis y/o datos analíticos de sepsis.

### III. CRITERIOS DE INGRESO

- **Gravedad**: FR  $\geq$  25 pm; Hipotensión, SatO2 basal  $<$  92%, T<sup>a</sup>  $>$  38<sup>o</sup>
- **Necesidad de antibiótico intravenoso** sin alternativa ambulatoria o por fracaso previo vía oral

### IV. TRATAMIENTO

#### Pacientes que no precisan ingreso

→ Se recomienda en general siempre que aparezca un cambio en la coloración del esputo o aparición de purulencia en el mismo.

**Sin cultivos previos: Levofloxacino** 750 mg /24 h vo.

**Duración del tratamiento: 10 días.**

**Con cultivos** (previos o del proceso actual)

- *H. influenzae*: **Amoxicilina/Clavulánico** 875/125 mg /8h vo.
  - Alternativas **Cefuroxima** 500 mg / 12h vo.
- *S. aureus*: **Amoxicilina/Clavulánico** 875/125 mg / 8h vo.
- *Pseudomonas*: **Levofloxacino** 750 mg / 12h vo.

**Duración del tratamiento: 10 días, salvo *P. aeruginosa* 14 días.**

## Antibiótico intravenoso: Fracaso tratamiento oral o situación de gravedad

- **Antibioterapia empírica** (si no disponemos de información previa)
  - Cubrir *Pseudomonas Aeruginosa* y *S. aureus* MR
    - **Meropenem 1g /8h iv** (o Aztreonam 2g /8h iv si alergia a betalactámicos) +- **Linezolid 600 mg / 12h iv** o vo.
- **Antibioterapia dirigida:**
  - Según antibiograma.
  - Siempre cubrir con dos antibióticos activos en caso de neumonía o gravedad.

**Duración del tratamiento: 14 días.**

Consultar Equipo PROA.